

معلومات عن براداكسا® Pradaxa للأشخاص الذين لديهم الرجفان الأذيني اللاصمامي

ما هو براداكسا؟

براداكسا هو دواء "مضاد للتجلط"، أو مضاد للتخثر والذي يساعد في تخفيض خطر الجلطة الدماغية للأشخاص الذين لديهم الرجفان الأذيني اللاصمامي (NVA).

لماذا تم وصف براداكسا لك؟

لقد شخّص طبيبك بأنك تعاني من NVA، هذا يعني بأن قلبك ينبض بصورة غير منتظمة وأن دمك لا يضخ بفعالية كما يجب. هذا قد يؤدي إلى "تجميع" الدم في القلب مما قد يؤدي إلى تشكيل جلطة. قد تدور الجلطة مع دمك إلى أجزاء أخرى من جسمك، ومن ضمنها دماغك. إذا التصقت الجلطة بوعاء دموي في دماغك، قد تقطع إمداد الدم، وتسبب حصول سكتة دماغية. بدون علاج، يكون خطر حصول سكتة دماغية لدى الأشخاص الذين لديهم الرجفان الأذيني هو أعلى حتى سبع مرات من الشخص الذي ليس لديه الرجفان الأذيني. يستعمل براداكسا لمنع تكون جلطات الدم ويساعد في تخفيض خطر السكتة الدماغية.

نصيحة عملية للمرضى الذين يتناولون براداكسا

كيف يجب أن أتناول براداكسا؟

تناول كبسولة واحدة مرتين في اليوم (صباحاً ومساءً)، مع أو بدون طعام. ابتلع الكبسولة كاملة مع كوب من الماء، لا تمضغ أو تفتح الكبسولة.

ماذا يحصل إذا ما فاتني أخذ جرعة؟

لا يزال بإمكانك تناول الجرعة التي فاتتك حتى 6 ساعات قبل جرعتك التالية. بعد ذلك الوقت، لا تتناول الجرعة التي فاتتك. ببساطة، تناول جرعتك التالية عندما يحين أوانها. لا تتناول جرعتين في نفس الوقت أبداً.

هل هناك عوارض جانبية تتعلق بتناول براداكسا؟

العوارض الجانبية الأساسية لأي مضاد للتخثر، متضمناً براداكسا، هو النزيف. باستطاعتك الحفاظ على صحتك عبر مراقبة مؤشرات النزيف (انظر الجهة الأخرى). في حال الاكتشاف المبكر، باستطاعتك تجنب تحوّل المشاكل الصغيرة إلى مشاكل خطيرة.

ماذا إذا كنت أتناول أدوية أخرى؟

قد تتعارض بعض الأدوية مع براداكسا. أخبر طبيبك أو الصيدلي دائماً عن الأدوية التي تتناولها (من ضمنها تلك التي حصلت عليها بدون وصفة طبية من صيدليتك أو السوبرماركت أو متجر الغذاء الصحي).

كيف يجب أن أأخذ براداكسا؟

يجب تخزين براداكسا في مكان بارد وجاف تحت 30 درجة مئوية. احفظ الكبسولات في التغليف الأصلي حتى يحين وقت استعمالها.



من المهم أن لا تتوقف عن تناول براداكسا بدون التكلم مع طبيبك أو الصيدلي.



متى يجب عليك الاتصال بطبيبك؟

من المهم أن يعلم مختصو الرعاية الصحية (مثل الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضين وموظفي الإسعاف) بأنك تتناول براداكسا. قد يؤثر ذلك على ما يقدموه من نصيحة أو علاج.

إذا كنت ستخضع لعملية جراحية، من ضمنها أي علاج أسنان، أخبر طبيبك أو طبيب أسنانك بأنك تتناول براداكسا.



إذا كنت تخطط للسفر، أخبر طبيبك للتأكد من وجود كمية من الدواء كافية لكل الرحلة.



قل لطبيبك إذا وقعت أو أصبت بجرح خلال العلاج، خصوصاً إذا صدمت رأسك.



قل لطبيبك بسرعة عاجلة أو اذهب إلى أقرب قسم طوارئ في مستشفى إذا لاحظت أي من أعراض النزيف التالية:



- تكدم حاد يزداد سوءاً؛
- أي نزيف يأخذ وقتاً طويلاً كي يتوقف؛
- نزيف العادة الشهرية الذي هو أكثر من المعتاد، أو نزيف مهبطي لا يمكن تفسيره؛
- بول أحمر داكن أو بني، أو تَغُوط أحمر أو بني داكن أو أسود؛
- سعال فيه دم؛
- تقيؤ فيه دم أو داكن اللون؛
- صداع شديد أو دوار؛
- ضعف أو نعاس؛
- ألم أو تورم أو انزعاج غير عادي؛ أو
- أي صعوبة في التنفس.

في حالات الطوارئ، من المهم أن تخبر المسعفين وموظفي المستشفى بأنك تتناول براداكسا. يتوافر عامل كيميائي خاص معاكس يمكن استعماله لإيقاف تأثيرات براداكسا في الطوارئ أو قبل العملية الجراحية الطارئة.



للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة كتيّب Consumer Medicine Information الموجود مع حزمة براداكسا.